



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 10 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 10 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 21.7 - 25.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 761.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.1^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.6^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 539.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 209.7 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 698.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 19.6 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 22-24/10, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Từ chiều tối và đêm 24-25/10, có mưa to đến rất to và dông. Từ ngày 26-28/10, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 26/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 28/10-01/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.0	23.6	25.8	221.6
Trong tuần	25.8	21.7	23.7	761.4
Tuần tới	26.6	23.3	24.9	62.5

II. Đặc trưng nông nghiệp

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều diện tích cây trồng thuộc khu vực Bắc Trung Bộ trong tuần qua đã bị ngập úng, đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 02 tháng 10 như sau:

Lúa hè thu, lúa mùa sớm và lúa chính vụ đã thu hoạch xong, lúa mùa muộn giai đoạn trổ - chín. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động dao động từ 21.7 - 25.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 761.4mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần tăng mạnh so với tuần trước, điều kiện thời tiết tuần này không phù hợp với các giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh tuyền trùng hại thân lúa, sâu năn, bệnh thối thân lúa. Với số liệu dự báo, nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa tuần kế tiếp giảm, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp: bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen. Đối với phần diện tích lúa bị ngập úng lâu ngày, sau khi nước rút cần vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư, cày bừa phơi đất, xử lý đất bằng vôi bột hoặc một số chế phẩm xử lý đất như Pennac P, EM, Trichoderma...chuẩn bị giống để gieo sạ cho vụ tiếp theo.

Mía: tiếp tục giai đoạn vươn lóng với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25°C, nhiệt độ tuần 2 tháng 10 dao động trong dao động từ 21.7 - 25.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 761.4mm, có thể nhận thấy

điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển do lượng mưa tương đối lớn, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh trắng lá, rệp sáp đỏ; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời. Dự báo tuần kế tiếp nhiệt độ có xu hướng tăng trong khi lượng mưa giảm mạnh so với tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh cháy lá, bọ phấn trắng.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông là loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, nhiệt độ trong tuần dao động từ 21.7 - 25.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 761.4mm và dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp tăng và lượng mưa giảm mạnh, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: ong ăn lá, sâu đục ngọn, bọ hung nâu.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển củ - thu hoạch, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C, nền nhiệt tuần này dao động từ 21.7 - 25.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 761.4mm, không thực sự phù hợp cho sắn phát triển bình thường do lượng mưa lớn, có thể gây úng ngập đồng ruộng, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa có xu hướng giảm, cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút. Đối với phần diện tích bị ngập sâu, khẩn trương thu hoạch sản phẩm ở những ruộng gần đến thời gian thu hoạch hoặc tận thu ở ruộng bị hại nặng. Thực hiện tháo nước nhanh, kịp thời, khơi thông dòng chảy, không để nước ngập lâu trong ruộng gây thối cây, thối củ.

Ngô: trong giai đoạn xoáy nõn - trỗ, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C. Nhiệt độ tuần này dao từ 21.7 - 25.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 761.4mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu cắn lá thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần sau lượng mưa giảm mạnh và nhiệt độ tăng so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là bắp cải, khai lang, khoai sọ... Nhiệt độ trung bình tuần này là 23.7 độ C, giảm nhẹ so với tuần trước, nhưng lượng mưa lớn, điều kiện khí hậu không thực sự phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ tăng và lượng mưa có xu hướng giảm mạnh (700mm), cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa. Riêng phần diện tích hoa màu bị ngập sâu: Với ruộng ngập thời gian ngắn và cây rau còn nhỏ có khả năng phục hồi cần phun các loại thuốc

phòng trừ nấm hại như: Anvil, Ridomil, Oxyclozox... để phòng trừ nấm lở cổ rễ; kết hợp chế phẩm KH, Pennac P, siêu lân..., chăm sóc bổ sung, bón thêm phân khi thời tiết thuận lợi giúp cây nhanh phục hồi; Đối với những diện tích bị ảnh hưởng nặng, không có khả năng cho thu hoạch cần vệ sinh đồng ruộng, chủ động chuẩn bị đất để gieo trồng lại.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh): đang giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ tuần dao động từ 21.7 - 25.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 761.4mm, chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo giảm mạnh; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh. Đối với phần diện tích cây ăn quả bị ngập, cần thoát nước nhanh trong vườn, cắt bỏ những cành gãy, cành bị tổn thương nặng, xới mặt đất để phá váng khi đất đã se mặt, giúp đất được thông thoáng, cung cấp các dưỡng chất qua lá (phân bón lá Yogen; phân bón lá Đầu trâu) ... để tăng cường khả năng hồi phục của cây.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 23.3 - 26.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.9°C, tổng lượng mưa là 62.5mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng và lượng mưa giảm mạnh, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc và chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng